



UW Medicine

Ngừng Thuốc Trước Khi Phẫu Thuật Thần Kinh

Những gì quý vị cần biết

Tài liệu này liệt kê các loại thuốc quý vị có thể và không thể dùng trong những ngày trước khi phẫu thuật thần kinh.

Tại sao tôi cần ngừng dùng một số loại thuốc của mình?

Một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Những loại thuốc này nên được dừng lại trước khi phẫu thuật.

Tôi nên làm gì?

Đọc phần “Các Loại Thuốc Cần Ngừng” trên trang 2. Xem có bất kỳ loại thuốc nào của quý vị nằm trong danh sách các loại thuốc nên ngừng lại không.

Nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào trong danh sách đó thì:

- Nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật của quý vị trước khi quý vị ngừng dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào. Hãy chắc chắn rằng quý vị biết loại thuốc nào là cần dừng lại và khi nào.
- Nói với Bác Sĩ Chính của quý vị rằng quý vị sẽ có phẫu thuật thần kinh và bác sĩ phẫu thuật đã bảo quý vị ngừng dùng một số loại thuốc trước khi làm thủ thuật. Nếu quý vị hoặc Bác Sĩ Chính của quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi cho Phòng khám Phẫu thuật Thần kinh theo số 206.744.9340.
- Nếu quý vị không ngừng dùng các loại thuốc này như bác sĩ phẫu thuật đã hướng dẫn, chúng tôi sẽ cần làm hẹn lại cho cuộc phẫu thuật.

Các hướng dẫn khác

- Nếu quý vị bị dị ứng với thuốc hoặc thuốc cản quang (thuốc nhuộm X quang), quý vị có thể cần dùng các loại thuốc khác trước khi phẫu thuật. Nếu cần, một thành viên của nhóm chăm sóc của quý vị sẽ gọi cho quý vị với các hướng dẫn.
- Vào ngày trước khi phẫu thuật, một y tá sẽ gọi cho quý vị và ôn lại các loại thuốc và hướng dẫn.



Nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật của quý vị trước khi quý vị ngừng dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào.

Các Loại Thuốc Cần Ngừng Trước Khi Phẫu Thuật

Nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật của quý vị nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây, hoặc bất kỳ *thuốc chống đông máu* (chất làm loãng máu) nào mà không được liệt kê. **Làm theo hướng dẫn của bác sĩ phẫu thuật của quý vị về thời điểm dừng thuốc trước khi phẫu thuật.**

Thuốc chống đông máu và chống kết tập tiểu cầu

Thuốc	Tên hiệu	Đa số bệnh nhân ngừng uống
Enoxaparin	Lovenox	Đêm trước phẫu thuật
Heparin	Heparin	
Apixaban	Eliquis	3 ngày trước phẫu thuật
Dabigatran etelixate	Pradaxa	
Edoxaban	Savaysa	
Fondaparinux	Arixtra	
Rivaroxaban	Xarelto	
Aspirin	Bayer, Bufferin, Excedrin	7 ngày trước phẫu thuật
Clopidogrel	Plavix	
Dalteparin	Fragmin	
Prasugrel	Effient	
Ticagrelor	Brilinta	
Warfarin	Coumadin	14 ngày trước phẫu thuật
Ticlopidine	Ticlid	

Câu hỏi?

Câu hỏi của quý vị rất quan trọng. Gọi một trong những số dưới đây nếu quý vị có câu hỏi hoặc lo ngại.

Để làm cuộc hẹn, hãy gọi Trung tâm Liên lạc tại số 206.744.9340.

Nói chuyện với một y tá phòng khám vào các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, gọi số 206.744.9340 và bấm số 2.

Sau giờ làm việc và vào cuối tuần và ngày lễ, gọi cho Y Tá Chăm Sóc Cộng Đồng theo số 206.744.2500.

Thuốc Kháng viêm không steroid

Hầu hết các lần, những loại thuốc này nên được ngừng **7 ngày trước** khi phẫu thuật thần kinh.

- Celecoxib (Celebrex)
- Ibuprofen (Advil, Children's Advil, Children's Motrin, Motrin, Nuprin, Rufen)
- Ketorolac tromethamine (Toradol)
- Meloxicam (Mobic)
- Naproxen (Aleve, Anaprox, BC-Naprosyn, Naprelan)

Những thuốc này thì ĐƯỢC dùng

Nếu quý vị sử dụng một loại thuốc được liệt kê dưới đây, phẫu thuật của quý vị có thể tiến hành theo kế hoạch. Nhưng, vui lòng kiểm tra với bác sĩ phẫu thuật của quý vị để đảm bảo rằng vẫn ổn khi tiếp tục dùng thuốc trước và sau khi phẫu thuật.

- Acetaminophen (Tylenol)
- Steroids (hỏi bác sĩ phẫu thuật)
- Thuốc tránh thai: Thuốc uống, miếng dán hoặc vòng

UW Medicine

Stopping Medicines Before Your Neurosurgery

What you need to know

This handout lists medicines you can and cannot take in the days before your neurosurgery.

Why do I need to stop taking some of my medicines?

Some medicines may increase your risk of bleeding. These medicines should be stopped before your surgery.

What should I do?

Read the section “Medicines to Stop Taking” on page 2. See if any of your medicines are on the list of drugs that should be stopped.

If you are taking any of the drugs on the list:

- Talk with your surgeon before you stop taking any prescribed medicines. Make sure you know which medicines to stop and when.
- Tell your PCP that you are having neurosurgery, and that your surgeon has told you to stop taking some of your medicines before the procedure. If you or your PCP have questions, please call the Neurosurgery Clinic at 206.744.9340.
- If you do not stop taking these medicines as your surgeon has instructed, we will need to reschedule your surgery.



Talk with your surgeon before you stop taking any prescribed medicines.

Other Instructions

- If you have allergies to medicines or *contrast* (X-ray dye), you may need to take other medicines before your surgery. If needed, a member of your care team will call you with instructions.
- On the day before your surgery, a nurse will call you and review your medicines and instructions.

Medicines to Stop Taking Before Surgery

Talk with your surgeon if you are taking any of the medicines listed below, or any *anticoagulants* (blood-thinners) not listed. **Follow your surgeon's instructions about when to stop your medicines before surgery.**

Anticoagulant and Anti-Platelet Aggregation Medicines

Drug	Brand Name	Most Patients Stop Taking
Enoxaparin	Lovenox	Night before surgery
Heparin	Heparin	
Apixaban	Eliquis	3 days before surgery
Dabigatran etelixate	Pradaxa	
Edoxaban	Savaysa	
Fondaparinux	Arixtra	
Rivaroxaban	Xarelto	
Aspirin	Bayer, Bufferin, Excedrin	7 days before surgery
Clopidogrel	Plavix	
Dalteparin	Fragmin	
Prasugrel	Effient	
Ticagrelor	Brilinta	
Warfarin	Coumadin	14 days before surgery
Ticlopidine	Ticlid	

Questions?

Your questions are important. Call one of the numbers below if you have questions or concerns.

For scheduling, call the Contact Center at 206.744.9340.

To talk with a clinic nurse weekdays from 8 a.m. to 4 p.m., call 206.744.9340 and press 2.

After hours and on weekends and holidays, call the Community Care Nurse at 206.744.2500.

Non-Steroidal Anti-Inflammatory (NSAID) Medicines

Most times, these medicines should be held **7 days before** neurosurgery.

- Celecoxib (Celebrex)
- Ibuprofen (Advil, Children's Advil, Children's Motrin, Motrin, Nuprin, Rufen)
- Ketorolac tromethamine (Toradol)
- Meloxicam (Mobic)
- Naproxen (Aleve, Anaprox, BC-Naprosyn, Naprelan)

Medicines That Are OK to Take

If you use a type of medicine listed below, your surgery can proceed as planned. But, please check with your surgeon to make sure that it is OK to keep taking your medicine before and after your surgery.

- Acetaminophen (Tylenol)
- Steroids (ask your surgeon)
- Contraceptives: Oral, patch, or ring