



UW Medicine

Sugammadex

Lo que necesita saber

Este folleto es para las mujeres que recibieron el medicamento sugammadex durante la cirugía.

¿Qué es sugammadex?

Sugammadex (pronunciado *soo-GAM-ma-dex*) es un fármaco que a menudo se da a los pacientes durante la cirugía. Se administra mediante una inyección en la vena.

Sugammadex se usa para revertir los efectos de otros medicamentos que se usan para ayudar a relajar los músculos.



Importante: Si recibió sugammadex durante su cirugía, es posible que sus medicamentos anticonceptivos no funcionen durante 7 días después de la cirugía. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

¿Qué necesito saber sobre este medicamento?

- **Es posible que las pastillas anticonceptivas, los parches, los DIU hormonales, los anillos, las inyecciones y los implantes no funcionen durante 1 semana después de recibir sugammadex.**
- Si no desea quedar embarazada:
Durante 7 días posteriores a la administración de este medicamento, deberá usar condones, gel espermicida u otro método anticonceptivo no hormonal. Esto se agrega a otros métodos anticonceptivos que pueda estar usando.

Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento o sus métodos anticonceptivos, hable con su médico, farmacéutico o proveedor de atención médica.

¿Preguntas?

Sus preguntas son importantes. Llame a su médico, farmacéutico o proveedor de salud si tiene preguntas o inquietudes.

Sugammadex

What you need to know

This handout is for women who received the drug sugammadex during surgery.

What is sugammadex?

Sugammadex (pronounced *soo-GAM-ma-dex*) is a drug that is often given to patients during surgery. It is given by injection into a vein.

Sugammadex is used to reverse the effects of other drugs that are used to help your muscles relax.



Important: *If you received sugammadex during surgery, your birth control medicines may not work for 7 days after your surgery. Please talk with your healthcare provider if you have any questions.*

What do I need know about this drug?

- **Birth control pills, patches, hormonal IUDs, rings, injections, and implants may not work for 1 week after you receive sugammadex.**

- If you do not want to become pregnant:

For 7 days after receiving this drug, you will need to use condoms, spermicidal jelly, or another non-hormonal form of birth control. This is in addition to other birth control methods you may be using.

If you have any questions about this drug or your birth control methods, talk with your doctor, pharmacist, or healthcare provider.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor, pharmacist, or healthcare provider if you have questions or concerns.