

Cómo prepararse para su procedimiento

- Haga arreglos para que alguien le lleve a casa después del procedimiento, si es posible.
- Puede comer normalmente y tomar sus medicamentos de rutina.

Cómo se realiza el procedimiento

Este procedimiento tiene lugar en la clínica y normalmente dura menos de 1 hora. Esto incluye el tiempo de recuperación.

Se aplica un *anestésico* (medicamento entumecedor) local a su tímpano. Luego, se hace una pequeña incisión en su tímpano y se inserta un pequeño tubo a través de esta incisión. Luego se inyecta un medicamento antibiótico (Gentamicina) o un esteroide (Dexametasona) dentro de su oído medio.

El número de inyecciones que reciba y la duración de su tratamiento en general se basarán en su plan de tratamiento.

Qué esperar después de su procedimiento

Efectos colaterales

Podría tener un ligero desequilibrio por 7 a 10 días si se le ha tratado con Gentamicina.

Dolor

La mayoría de los pacientes tienen muy poco dolor después de este procedimiento. Puede tomar acetaminofeno (Tylenol) o ibuprofeno (Advil, Motrin) si es necesario.

Dieta

Usted puede comer normalmente.

Volver al trabajo

No necesitará tomar días de permiso en el trabajo después de este procedimiento.

Precauciones y cuidados personales para acelerar su recuperación

- No permita que entre agua dentro de su oído hasta que su médico le diga que está bien.

Seguimiento

Usted tendrá que volver a la clínica con frecuencia para hacer que se controle su audición. Su médico le dirá con cuánta frecuencia tendrá que venir.

Sus citas de seguimiento:

How to Prepare for Your Procedure

- Arrange for someone to drive you home after your procedure, if possible.
- You may eat normally and take your regular medicines.

How the Procedure Is Done

This procedure takes place in the clinic and usually lasts less than 1 hour. This includes recovery time.

A local *anesthetic* (numbing medicine) is applied to your eardrum. Then, a small incision is made in your eardrum and a small tube is inserted through this incision. An antibiotic (Gentamycin) or a steroid medicine (Dexamethasone) is then injected into your middle ear.

The number of injections you receive and the length of your overall treatment will be based on your treatment plan.

What to Expect After Your Procedure

Side Effects

You may have mild imbalance for 7 to 10 days if you were treated with Gentamycin.

Pain

Most patients have very little pain after this procedure. You may take acetaminophen (Tylenol) or ibuprofen (Advil, Motrin) if needed.

Diet

You may eat normally.

Return to Work

You will not need to take time off work after this procedure.

Precautions and Self-care to Speed Your Recovery

- Do **not** allow water to get into your ear until your doctor tells you this is OK.

Follow-up

You will need to return to the clinic often to have your hearing checked. Your doctor will tell you how often you will need to come in.

Your Follow-up Appointments:
