

리바록사벤 치료

제렐토

이 유인물은 혈전을 예방하고 치료하는 약물인 리바록사벤이라는 약을 설명합니다.

리바록사벤은 무엇인가?

리바록사벤(상표명 제렐토)는 항응고제입니다. “항”은 대항을 의미하고 “응고제”는 피가 엉기는 것을 의미합니다. 항응고제는 혈액에 혈전이 형성되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

비록 리바록사벤이 때때로 “피를 묽게하는 약”이라고 불리기도 하지만 이것은 피를 묽게 하지 않습니다. 이것은 보통 혈액의 혈전을 형성하는 부분을 차단함으로써 작용합니다.

복용하는 이유는?

귀하의 의사는 혈전을 치료하거나 예방하기 위하여 리바록사벤을 처방했습니다. 귀하는 혈전을 유발할 수 있는 다음과 같은 상태 중 하나가 있을 수도 있습니다:

- **심방세동:** 심장의 한 부위가 제대로 뛰지 않을 경우 심장 안에 혈전이 형성될 수 있습니다. 이 혈전의 일부분이 떨어져 나가서 뇌로 이동하고 뇌졸중을 초래할 수 있습니다.
- **수술:** 혈전은 고관절 또는 무릎을 대체하는 수술을 포함한 수술 후 형성될 수도 있습니다.
- **심정맥 혈전증(DVT) 및 폐색전증(PE):** DVT는 정맥, 일반적으로 다리의 정맥에 형성되는 혈전입니다. PE는 폐에 있는 혈전입니다.



고관절이나 무릎 관절 교체 수술을 받은 직후 걸을 수 없는 것은 다리에 혈전이 생기는 위험성을 높입니다.

리바록사벤의 작용 방식은?

혈전이 형성되기 위해서는 많은 것들이 체내에서 일어나야 합니다. 응고인자라고 하는 혈액의 자연적인 부분이 이 과정에 관여합니다.

리바록사벤은 인자 Xa 라고 부르는 응고 인자를 차단합니다. 리바록사벤은 혈전이 형성되는 것을 멈추는 것을 도울 수 있고 혈전이 더 커지는 것을 막을 수 있지만 귀하가 이미 갖고 있는 혈전을 분해하지는 않습니다.

리바록사벤이 작용하기 위해서는 얼마나 오래 걸립니까?

리바록사벤은 첫번째 약을 복용한 후 몇시간 이내로 혈전을 감소시키기 시작합니다. 리바록사벤의 복용을 중단하는 경우 대부분의 사람들에게는 24 시간 이내에 응고에 대한 효과가 사라지기 시작합니다.

리바록사벤은 얼마나 복용해야 하나?

리바록사벤은 10 밀리그램, 15 밀리그램, 및 20 밀리그램 정제로 나옵니다. 담당의는 귀하를 위하여 적정 용량을 결정할 것입니다. 복용량은 신장의 기능 및 귀하가 복용하는 다른 약들에 달려있습니다.

세(3)가지 흔한 상태를 위한 일반적인 복용량:

심방세동	15 밀리그램 또는 20 밀리그램, 하루 한 번 저녁 식사와 함께
수술 이후	10 밀리그램, 하루 한 번 음식과 함께 아니면 공복에 (첫번째 복용은 수술 이후 6~10시간 지나서. 약은 한 달까지 복용.)
심정맥 혈전증 및 폐 색전증	시작하는 복용량: 15 밀리그램, 하루 두 번, 음식과 함께 21일 동안. 21일 이후: 20 밀리그램, 하루 한번, 음식과 함께 (적어도 두 달 동안)

리바록사벤 복용 방법은?

리바록사벤은 담당의가 처방한 그대로, 그리고 매일 같은 시간에 복용하십시오:

- 10 밀리그램 알약은 음식과 함께 또는 공복에 복용할 수 있습니다.
- 15 밀리그램이나 20 밀리그램 알약은 **반드시** 음식과 함께 복용해야 합니다.
- 만일 심방세동으로 인한 뇌졸증을 예방하기 위하여 리바록사벤을 복용하고 있는 경우 저녁식사와 함께 약을 복용하십시오.

- 리바록사벤 알약은 필요한 경우 부셔서 복용할 수 있습니다.
- 담당의가 하라고 말하기 전에는 리바록사벤의 복용을 중단하지 **마십시오**.

리바록사벤 보관 방법은?

- 실온에서 건조한 장소에 보관하십시오. 욕실에 보관하지 마십시오.
- 모든 의약품은 어린이와 애완동물의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하십시오.
- 사용하지 않았거나 만료된 의약품은 쓰레기통에 버리십시오. 달리 지시가 없는 한 번기에 버리거나 배수구에 붓지 마십시오. 여러분의 의약품을 버리는 가장 좋은 방법에 대해 약사에게 문의하십시오.

복용할 시기를 놓치면 어떻게 합니까?

리바록사벤의 복용을 놓치지 않도록 하십시오. 만일 복용시기를 놓쳤을 경우:

- 리바록사벤을 하루 한번 복용하고 같은 날 기억이 나는 경우 생각이 나자마자 복용하십시오.
- 리바록사벤을 하루 두 (2) 번 복용하는 경우 15 밀리그램 정제 두알을 한꺼번에 복용해도 되지만 약을 복용하지 않은 그 날에만 한정됩니다. 다음 날 15밀리그램 정제를 한 알씩 하루에 두번으로 다시 복용하십시오.
- 하루 종일 약을 복용하지 않은 경우 항응고과나 담당의에게 전화하십시오. 연락을 할 수 없는 경우 복용하는 것을 건너뛰고 다음 날 정상적인 시간에평소대로 복용량을 복용하십시오.

리바록사벤을 너무 많이 복용한 경우 즉시 담당의에게 전화하거나 제일 가까운 응급실로 가십시오.

약을 재구입해야 합니까?

리바록사벤은 떨어지지 **않도록** 하십시오. 약이 떨어지기 **전에** 리바록사벤을 재구입하십시오. 혈전퇴치효과는 대략 24 시간 이내에 사라지기 시작합니다.

이것은 매우 위험할 수 있습니다.

리바록사벤의 부작용은 무엇입니까?

리바록사벤을 사용하면서 가벼운 출혈은 정상입니다. 심한 출혈은 더 심각합니다.

가벼운 출혈

- 치아를 칫솔질을 할 때 잇몸 출혈
- 코피
- 쉽게 멍이 듦
- 작은 상처에서 정상보다 출혈이 더 남

- 여성의 경우 더 길고 하혈이 심한 생리

심한 출혈

리바록사벤은 또한 사망으로 이어질 수 있는 심각한 출혈을 초래할 수 있습니다. (다음 페이지의 “언제 의사에게 전화해야 하나”를 참조). **출혈이 시작될 경우, 리바록사벤의 효과를 되돌리는 약이 있습니다.** 또한 담당의는 수혈과 기타 방법으로 귀하를 치료할 수도 있습니다.

그 외의 부작용

그 외의 일반적인 리바록사벤의 부작용들이 있습니다. 다음과 같은 증세들로 힘들 경우 담당 의료인과 상담하십시오:

- 가려움증
- 저릿저릿함 또는 따금거리는 느낌
- 물집
- 수술 부위로부터 체액 분비 증가(수술 이후 혈전증을 예방하기 위해서 리바록사벤을 복용할 경우)

담당의에게 전화해야 할 때

다음과 같은 증세가 있을 경우 담당의에게 전화하거나 가장 가까운 응급실로 가십시오:

- 팔이나 다리가 갑자기 힘이 없어짐
- 몸의 어느 곳이든지 갑자기 감각이 둔감해지거나 저릿저릿 해짐
- 시력의 변화 또는 한 쪽이나 양쪽 눈을 볼 수 없음
- 갑자기 말이 어눌해지거나 말을 할 수 없음
- 현기증 또는 실신
- 팔, 다리, 또는 발에 새로운 통증, 부종, 붉어짐, 또는 열이 남
- 새롭게 숨이 가쁘거나 가슴이 아픔
- 심하게 넘어지거나 머리를 부딪힘
- 멈추지 않거나 매우 심각한 출혈
- **심각한 출혈의 징후:**
 - 눈의 출혈
 - 붉거나 짙은 갈색 소변



처방약이나 비처방 의약품, 자연 약초, 또는 비타민 보충제를 시작하거나 중단할 때마다 담당의 또는 항응고과에 전화하십시오. 리바룩사벤과의 의약품 상호작용은 출혈의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

- 붉거나 검은색의 타르 같은 대변
- 피를 토하거나 기침할 때 피가 나옴(구토물이 커피 찌꺼기처럼 보일 수도 있음)
- 심각한 두통이나 복통
- 알 수 없는 이유로 나타나는 타박상
- 코피, 잇몸 출혈, 또는 계속해서 발생하는 이상한 출혈

리바룩사벤은 다른 의약품의 작용방식에 영향을 줍니까?

인체의 응혈 능력을 저하시키는 또 다른 약을 복용하는 동안 리바룩사벤을 복용할 경우 귀하는 출혈의 위험성이 더 높아질 수도 있습니다. 리바룩사벤을 복용하고 있을 경우 **담당의나 항응고과에 먼저 확인하지 않고 다음과 같은 의약품을 복용하지 마십시오:**

- 아스피린 또는 알카셀처, 베이어, 뷰퍼린, 엑세드린, 나이퀼, 및 펩토 비스몰과 같은 아스피린이 함유된 제품들
- 아이뷰프로펜(모트린, 애드빌) 및 그 외의 셀레코싯(셀레브렉스), 다이클로페낙(카타플램, 볼트런), 인도메타신(인도신), 키토프로펜(엑트론, 오루디스), 멜록시캠(모빅), 내뷰머톤(렐라펜), 내프록센(얼리브, 내프로신, 및 그 외) 및 퍼록시캠(펠딘)과 같은 비스테로이드성 소염제(NSAIDs)
- 와파린 (쿠마딘)
- 헤파린이 함유된 의약품
- 클로피도그렐(플라빅스), 프레쓰그렐(에피엔트), 타이케그루로어(브릴린타)
- 대비게트렌 (프라덱사), 에픽사벤 (엘리퀴스), 이독사벤(싸베이싸), 비트릭사벤 (비바익사)

그 외의 약들도 인체 내에서 리바룩사벤이 작용하는 방식에 영향을 미칠 수도 있습니다. 어떤 약이든지 약을 새로 시작하거나 중단할 때마다 담당의나 항응고과에 말하십시오. 이것은 처방전없이 구입하는 약들, 약초제, 및 비타민을 포함합니다.

리바룩사벤을 복용하고 있음을 누구에게 말해야 합니까?

귀하의 **모든** 의료인들에게 귀하가 리바룩사벤을 복용하고 있음을 말하십시오. 이것은 담당하는 의사, 치과의, 및 처방약을 구입하는 곳의 모든 약사들을 포함합니다. 리바룩사벤을 복용한다는 것은 특정적인 의료상황에서 귀하를 치료하는 방법에 영향을 끼칠 수도 있습니다.



귀하의 모든 의료인들에게 리바록사벤을 복용하고 있는 것을 말할 것을 기억하십시오. 무슨 이유로 리바록사벤을 중단해야 할 경우 리바록사벤을 귀하에게 처방한 의사에게 말하십시오.

리바록사벤을 복용한다고 말하는 카드를 지갑에 넣고 다니십시오. 리바록사벤을 복용하는 것을 응급실 의료인에게 전달할 의학적 경고 팔찌나 목걸이를 차고 다니기를 원할 수도 있습니다.

리바록사벤을 중단해야 하는 경우가 있습니까?

- 담당의는 수술을 포함한 의학적 또는 치과적 시술 이전에 1 일 이상 리바록사벤의 복용을 중단하라고 말할 수도 있습니다.
- 경추막 외 도관을 사용하는 시술 전에는 리바록사벤 복용을 중단해야 합니다. 이것은 진통제와 마취제를 위해서 귀하의 등에 삽입하는 튜브입니다.
- 어떤 이유로든 리바록사벤 복용을 중단해야 하는 경우, 처방한 의사에게 연락하십시오. 언제 복용을 중단해야 하는지 알아보십시오. 이 의사는 또한 수술이나 시술 이후 리바록사벤 복용을 언제 시작해야 하는지 알려줄 것입니다.

리바록사벤을 복용하는 동안 있을 수도 있는 질문들

질문: 술을 마실 수 있습니까?

답변: 리바록사벤을 복용하는 동안은 알코올을 피하는 것이 제일 좋습니다. 알코올은 위나 장의 출혈의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

술을 마시는 경우 하루에 한 잔 이상 마시지 마십시오. 그리고 가끔씩이라도 한 번에 2 잔 이상 마시지 마십시오.

한 잔 = 맥주 한 (1) 잔 (12 온스), 또는 포도주 한 (1) 잔 (4 온스), 또는 칵테일 한 잔 (2 온스), 또는 1 shot (1½ 온스).

질문: 피해야 할 음식이 있습니까??

답변: 리바록사벤을 복용하고 있는 동안 모든 종류의 음식을 먹을 수 있습니다. 식사 제한이 없습니다.

질문: 활동에 제한을 두어야 합니까?

답변: 리바록사벤이 출혈의 위험을 증가시키기 때문에:

- 부상을 유발하는 활동을 피하십시오. 보통 걷기, 조깅, 수영, 및 정원 가꾸기와 같은 것들은 안전합니다.
- 현재의 활동에 대하여 담당의 또는 항응고과 약사 또는 간호사에게 말하십시오. 리바록사벤을 복용하는 동안 이것들을 계속하는 것이 안전한지를 말해줄 것입니다.

질문: 병이 나는 경우?

답변: 병이 나고 리바록사벤을 복용할 수 없는 경우 담당이나 항응고과에 전화하십시오. 3 페이지에 있는 “약을 복용하지 않았을 경우?”를 참조하십시오.

질문: 정기적인 혈액 검사가 필요합니까?

답변: 체내의 리바록사벤의 양을 확인하기 위해서 정기적인 혈액검사를 할 필요가 없습니다. 하지만 리바록사벤의 복용량은 귀하의 신장이 얼마나 잘 기능하고 있는지를 바탕으로 정해집니다. 이런 이유로 귀하의 의사는 귀하의 신장의 건강을 확인하기 위해서 때때로 혈액검사를 원할 수도 있습니다. 귀하는 또한 연례 혈구수치와 간기능 검사가 필요할 수도 있습니다.

질문: 임신했을 경우 리바록사벤을 복용할 수 있습니까?

답변: 우리는 리바록사벤이 임신이나 태아에게 미치는 영향을 알지 못합니다. 리바록사벤을 복용하고 있는 동안 임신이 되거나 임신할 계획이 있는 경우 임신 중 리바록사벤 복용의 혜택과 위험에 대한 상담을 위해서 담당의에게 즉시 전화하십시오.

문의사항?

귀하의 질문은 중요합니다.
질문이나 우려사항이 있을 경우
담당 의사나 의료제공자에게
전화하십시오.

혈액항응고과: 206.598.4874

Treatment with Rivaroxaban

Xarelto

This handout explains the medicine rivaroxaban, a drug that helps prevent and treat blood clots.

What is rivaroxaban?

Rivaroxaban (brand name Xarelto) is an *anticoagulant* medicine. “Anti” means against, and “coagulant” refers to blood clotting. An anticoagulant helps prevent clots from forming in your blood.

Although rivaroxaban is sometimes called a “blood thinner,” it does not thin your blood. It works by blocking the part of your blood that normally forms clots.

Why am I taking it?

Your doctor has prescribed rivaroxaban to treat or prevent blood clots. You may have one of these conditions that can cause clots:

- **Atrial fibrillation:** If part of the heart does not beat the way it should, blood clots can form within the heart. Parts of these clots can break off, travel to the brain, and cause a stroke.
- **Surgery:** Blood clots may form after surgery, including surgery to replace a hip or knee.
- **Deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE):** A DVT is a blood clot that forms in a vein, usually in the legs. A PE is a clot that is in the lung.



Not being able to walk right after hip or knee replacement surgery raises your risk of getting a blood clot in your legs.

How does rivaroxaban work?

Many things must happen inside the body for a blood clot to form. Natural parts of the blood called *clotting factors* are involved in this process.

Rivaroxaban blocks a clotting factor called *factor Xa*. Rivaroxaban can help stop clots from forming and can keep clots from getting larger, but it does not break up clots you already have.

How long does it take for rivaroxaban to work?

Rivaroxaban begins to reduce blood clotting within a few hours after taking the first dose. If you stop taking rivaroxaban, its effects on clotting begin to wear off within 24 hours for most people.

How much rivaroxaban should I take?

Rivaroxaban comes in 10 mg, 15 mg, and 20 mg tablets. Your doctor will decide which dose is right for you. Your dose will depend on how well your kidneys are working, and other medicines you take.

These are the usual doses for the 3 common conditions:

Atrial fibrillation	15 mg or 20 mg, once a day, with your evening meal
After surgery	10 mg, once a day, with or without food (First dose taken 6 to 10 hours after surgery. Medicine is taken for up to 1 month.)
DVT and PE	Starting dose: 15 mg, 2 times a day, with food , for 21 days After 21 days: 20 mg, once a day, with food (Taken for at least 2 more months.)

How should I take rivaroxaban?

Take rivaroxaban exactly as prescribed by your doctor, and at the same time each day:

- You can take the 10 mg tablets with or without food.
- You **must** take the 15 mg and 20 mg tablets with food.
- If you are taking rivaroxaban to prevent stroke in atrial fibrillation, take your dose with your evening meal.
- Rivaroxaban tablets can be crushed, if needed.
- Do **not** stop taking rivaroxaban unless your doctor tells you to.

How should I store rivaroxaban?

- Store at room temperature, in a dry place. Do **not** store in a bathroom.
- Keep all medicines in a safe place, out of the reach of children and pets.
- Put unused or expired medicines in the trash. Do **not** flush them down a toilet or pour them down a drain, unless you are told to do so. Ask your pharmacist about the best way to throw away extra medicines.

What if I miss a dose?

Try not to miss any doses of rivaroxaban. If you do miss a dose:

- If you take rivaroxaban once a day and remember the same day, take it as soon as you remember.
- If you take rivaroxaban 2 times a day, you may take two 15 mg tablets at the same time, but **only** on the day you missed your dose. Go back to taking one 15 mg tablet twice a day the next day.
- If you miss a full day of your doses, call your anticoagulation clinic or your doctor. If you cannot reach them, skip your missed doses and take your usual dose the next day at the normal time.

If you take too much rivaroxaban, call your doctor right away or go to the nearest emergency room.

Do I need refills?

Do **not** run out of rivaroxaban. Refill your prescription **before** you run out. The clot-fighting effects begin to wear off in about 24 hours. **This can be very dangerous.**

What are the side effects of rivaroxaban?

Light bleeding is normal with rivaroxaban. Heavy bleeding is more serious.

Light Bleeding

- Gums bleeding when you brush your teeth
- Nosebleeds
- Easy bruising
- More bleeding than normal from small cuts
- For women, longer or heavier menstrual bleeding

Heavy Bleeding

Rivaroxaban can also cause severe bleeding that could lead to death (see “When to Call Your Doctor” on the next page). **If you start to bleed, there is a medicine that can reverse the effects of rivaroxaban.** Your doctor may also treat you with blood transfusions and other methods.

Other Side Effects

There are other common side effects of rivaroxaban. Talk with your healthcare provider if these symptoms are bothering you:

- Itching
- “Pins and needles” or a tingling feeling
- Blisters

- Increased fluid drainage from your surgery site (if you are taking rivaroxaban to prevent blood clots after surgery)

When to Call Your Doctor

Call your doctor or go to the nearest emergency room right away if you have:

- Sudden weakness in an arm or leg
- Sudden numbness or tingling anywhere in your body
- Changes in eyesight or not being able to see out of one or both eyes
- Suddenly having slurred speech or not being able to speak
- Dizziness or faintness
- New pain, swelling, redness, or heat in your arm, leg, or foot
- New shortness of breath or chest pain
- A serious fall or hit your head
- Any bleeding that does not stop or is very heavy
- Signs of **serious bleeding**:
 - Bleeding in your eyes
 - Red or dark brown urine
 - Red or black tarry stool
 - Vomiting or coughing up blood (vomit may look like coffee grounds)
 - Severe headache or stomachache
 - Bruises that appear for no known reason
 - Nosebleeds, bleeding gums, or strange bleeding that keeps happening

Does rivaroxaban affect how other medicines work?

You may have a higher risk of bleeding if you take rivaroxaban while you are taking other medicines that also lower your body's clotting ability. If you are taking rivaroxaban, **do NOT take any of these medicines without first checking with your doctor or anticoagulation clinic:**

- Aspirin or products that contain aspirin, such as Alka-Seltzer, Bayer, Bufferin, Excedrin, Nyquil, and Pepto-Bismol
- Ibuprofen (Motrin, Advil) and other *non-steroidal anti-inflammatory drugs* (NSAIDs) such as celecoxib (Celebrex), diclofenac (Cataflam, Voltaren), indomethacin (Indocin), ketoprofen (Actron, Orudis), meloxicam (Mobic), nabumetone (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn, and others), and piroxicam (Feldene)



Call your doctor or the anticoagulation clinic whenever you start or stop any prescription or over-the-counter medicine, herbal product, or vitamin supplement. Drug interactions with rivaroxaban can increase your risk of bleeding.

- Warfarin (Coumadin)
- Medicines that contain heparin
- Clopidogrel (Plavix), prasugrel (Effient), ticagrelor (Brilinta)
- Dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis), edoxaban (Savaysa), betrixaban (Bevyxxa)

Other drugs may also affect how rivaroxaban works in your body. Tell your doctor or anticoagulation clinic whenever you start or stop any medicine. This includes medicines you buy without a prescription, herbal products, and vitamins.

Who should I tell I am taking rivaroxaban?

Tell **all** your healthcare providers that you are taking rivaroxaban. This includes your doctors, dentist, and all pharmacists where you have prescriptions filled. Being on rivaroxaban may affect how they care for you in certain medical situations.

Carry a wallet card that says you take rivaroxaban. You may want to wear a medical alert bracelet or necklace that will tell emergency healthcare providers that you take rivaroxaban.

Are there any times I should stop taking rivaroxaban?

- Your doctor may tell you to stop taking rivaroxaban for 1 or more days before medical or dental procedures, including surgery.
- You **must** stop taking rivaroxaban before any procedure that uses an *epidural catheter*. This is a tube that is placed in your back for pain medicine and anesthesia.
- If you need to stop taking rivaroxaban for any reason, call the doctor who prescribed it for you. Find out when you should stop taking it. This doctor will also tell you when to start taking rivaroxaban again after your surgery or procedure.

Questions You May Have While Taking Rivaroxaban

Q. Can I drink alcohol?

It is best to avoid alcohol while taking rivaroxaban. Alcohol can increase the risk of bleeding in your stomach and intestines.

If you do drink alcohol, do not have more than 1 drink a day. And, do not drink more than 2 drinks at a time every now and then. One drink = 1 beer (12 oz.), **or** 1 glass of wine (4 oz.), **or** 1 cocktail (2 oz.), **or** 1 shot (1½ oz.).



Remember to tell all your healthcare providers that you are taking rivaroxaban. If you must stop rivaroxaban for any reason, tell the doctor who prescribed rivaroxaban for you.

Q. Do I need to avoid any foods?

You can eat all types of foods while you are taking rivaroxaban. There are no eating restrictions.

Q. Should I limit activities?

Since rivaroxaban increases your risk of bleeding:

- Avoid activities that could cause an injury. It is usually safe to walk, jog, swim, and work in the garden.
- Tell your doctor or anticoagulation clinic pharmacist or nurse what your current activities are. They will tell you if it is safe to keep doing these while taking rivaroxaban.

Q. What if I get sick?

Call your doctor or anticoagulation clinic if you get sick and cannot take your rivaroxaban. See “What if I miss a dose?” on page 3.

Q. Do I need to have regular blood tests?

You do **not** need to have routine blood testing to check the amount of rivaroxaban in your body. But, the dose of rivaroxaban is based on how well your kidneys are working. Because of this, your doctor may want you to have a blood test from time to time to check the health of your kidneys. You may also need yearly blood counts and liver function tests.

Q. Can I take rivaroxaban if I am pregnant?

We do not know how rivaroxaban affects pregnancy or unborn babies. If you become pregnant or plan to become pregnant while taking rivaroxaban, call your doctor **right away** to talk about the benefits and risks of taking rivaroxaban while you are pregnant.

Questions?

Your questions are important. Call your doctor or healthcare provider if you have questions or concerns.

Anticoagulation Clinic:
206.598.4874